【大腸癌】

レジメン名	一般名	投与量	1クール	用法	適応
mFOLFOXIRI＋Bmab療法（導入療法	ベバシズマブ	5 mg/kg		点滴静注 day1	
	イリノテカン	150 mg/㎡		点滴静注 day1	
	オキサリプラチン	85 mg/㎡	14日	点滴静注 day1	進行・再発大腸癌
	レボホリナート	200 mg/㎡		点滴静注 day1	
	5-FU	2400 mg/㎡		点滴静注（持続） day1～2	
mFOLFOXIRI＋Bmab療法（維持療法	ベバシズマブ	5 mg/kg		点滴静注 day1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	14日	点滴静注 day1	進行・再発大腸癌
	5-FU	2400 mg/㎡		点滴静注（持続） day1～day2	
Capecitabine＋Bmab療法	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	21日	点滴静注 day1	進行・再発大腸癌
	カペシタビン	2000 mg/㎡/day		内服 day1～day14	
FOLFIRI＋Bmab療法	ベバシズマブ	5 mg/kg		点滴静注 day1	
	イリノテカン	150 mg/㎡		点滴静注 day1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	14日	点滴静注 day1	進行・再発大腸癌
	5-FU	400 mg/㎡		点滴静注（急速） day1	
	5-FU	2400 mg/㎡		点滴静注（持続） day1～day2	
FOLFIRI＋Pmab療法	パニツムマブ	6 mg/kg		点滴静注 day1	
	イリノテカン	150 mg/㎡		点滴静注 day1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	14日	点滴静注 day1	進行・再発大腸癌
	5-FU	400 mg/㎡		点滴静注（急速） day1	
	5-FU	2400 mg/㎡		点滴静注（持続） day1～day2	
FOLFIRI＋Rmab療法	ラムシルマブ	8 mg/kg		点滴静注 day1	
	イリノテカン	150 mg/㎡		点滴静注 day1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	14日	点滴静注 day1	進行・再発大腸癌
	5-FU	400 mg/㎡		点滴静注（急速） day1	
	5-FU	2400 mg/㎡		点滴静注（持続） day1～day2	
FOLFIRI療法	イリノテカン	150 mg/㎡		点滴静注 day1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	14日	点滴静注 day1	進行・再発大腸癌
	5-FU	400 mg/㎡		点滴静注（急速） day1	
	5-FU	2400 mg/㎡		点滴静注（持続） day1～day2	
IRIS＋Bmab療法	ベバシズマブ	5 mg/kg		点滴静注 day1,15	
	イリノテカン	100 mg/㎡	28日	点滴静注 day1,15	進行・再発大腸癌
	テガフール・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡/day		内服 day1～day14	
mFOLFOX6＋Bmab療法	ベバシズマブ	5 mg/kg		点滴静注 day1	
	オキサリプラチン	85 mg/㎡		点滴静注 day1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	14日	点滴静注 day1	進行・再発大腸癌
	5-FU	400 mg/㎡		点滴静注（急速） day1	
	5-FU	2400 mg/㎡		点滴静注（持続） day1～day2	
mFOLFOX6＋Cmab（2週間毎）療法	セツキシマブ	500 mg/㎡		点滴静注 day1	
	オキサリプラチン	85 mg/㎡		点滴静注 day1	
	レボホリナート	200 mg/㎡	14日	点滴静注 day1	進行・再発大腸癌

	5-FU 5-FU	400 mg/㎡ 2400 mg/㎡		点滴静注(急速) day1 点滴静注(持続) day1～day2	
mFOLFOX6＋Cmab療法	セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	初回 400 mg/㎡ 2回目以降 250 mg/㎡ 85 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡	14日	点滴静注 day1,8 点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注(急速) day1 点滴静注(持続) day1～day2	進行・再発大腸癌
mFOLFOX6＋Pmab療法	パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	6 mg/kg 85 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡	14日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注(急速) day1 点滴静注(持続) day1～day2	進行・再発大腸癌
mFOLFOX6療法	オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	85 mg/㎡ 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡	14日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注(急速) day1 点滴静注(持続) day1～day2	術前・術後補助化学療法 進行・再発大腸癌
sLV5FU2+BV療法	ベバシズマブ レボホリナート 5-FU 5-FU	5 mg/kg 200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡	14日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 点滴静注(急速) day1 点滴静注(持続) day1～day2	進行・再発大腸癌
sLV5FU2療法	レボホリナート 5-FU 5-FU	200 mg/㎡ 400 mg/㎡ 2400 mg/㎡	14日	点滴静注 day1 点滴静注(急速) day1 点滴静注(持続) day1～day2	進行・再発大腸癌
SOX＋Bmab療法	ベバシズマブ オキサリプラチン テガフール・ギメラシル・オテラシル	7.5 mg/kg 130 mg/㎡ 80 mg/㎡/day	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 内服 day1～day14	進行・再発大腸癌
XELIRI＋Bmab療法	ベバシズマブ イリノテカン カペシタビン	7.5 mg/kg 150 mg/㎡ 1600 mg/㎡/day	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 内服 day1～day14	進行・再発大腸癌
XELOX＋Bmab療法	ベバシズマブ オキサリプラチン カペシタビン	7.5 mg/kg 130 mg/㎡ 2000 mg/㎡/day	21日	点滴静注 day1 点滴静注 day1 内服 day1～day14	進行・再発大腸癌
ロンサーフ＋Bmab療法	ベバシズマブ トリフルリジン・チピラシル	5 mg/kg 70 mg/㎡/day	28日	点滴静注 day1,15 内服 day1～day5, day8～day1	進行・再発大腸癌
XELOX療法	オキサリプラチン カペシタビン	130 mg/㎡ 2000 mg/㎡/day	21日	点滴静注 day1 内服 day1～day14	術後補助化学療法 進行・再発大腸癌

大垣徳洲会病院　薬剤部　　2024年4月作成
2025年4月見直し
2026年4月改訂