

【脳腫瘍】

レジメン名	一般名	投与量	1クール	用法	適応
MTX大量療法	メトレキサート ホリナートカルシウム	3.5 g/m ² 1回15mg	21日	点滴静注 day1 メトレキサート投与後、3時間毎に9回 投与、その後6時間毎に8回投与する	中枢神経系原発悪性リンパ腫
TMZ+BV療法(放射線併用期)	ベバシズマブ テモゾロミド	10 mg/kg 75 mg/m ² /day	42日	点滴静注 day1,15,29,42 連日投与(放射線療法と併用)	脳腫瘍初発
TMZ+BV療法(維持療法期)	ベバシズマブ テモゾロミド	10 mg/kg 150 mg/m ² /day	28日	点滴静注 day1,15 5日間連日投与、23日間休薬	脳腫瘍初発
TMZ+BV療法(単剤療法期)	ベバシズマブ	15 mg/kg	21日	点滴静注 day1	脳腫瘍初発
TMZ療法	テモゾロミド	初回 75 mg/m ² /day 2回目以降 150 mg/m ² /day	42日 28日	連日投与(放射線療法と併用) 5日間連日投与、23日間休薬	脳腫瘍初発
BV療法	ベバシズマブ	10 mg/kg	14日	点滴静注 day1	脳腫瘍再発

大垣徳洲会病院 薬剤部

2024年4月作成